DLP 21-1-82909653

# AVERTISSEMENTS AGRICOLES

BULLETIN TECHNIQUE DES STATIONS D'AVERTISSEMENTS AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE =

## **ÉDITION DE LA STATION "CENTRE"**

(CHER, EURE-ET-LOIR, INDRE, INDRE-ET-LOIRE, LOIR-ET-CHER, LOIRET)

#### SERVICE DE LA PROTECTION DES VÉGÉTAUX

93, rue de Curambourg - B.P. 210 - 45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

Téléphone: (38) 86-36-24

Commission Paritaire de Presse nº 530 AD

**ABONNEMENT ANNUEL: 70 F** 

M. le Régisseur de recettes de la D.D.A. du Loiret

93, rue de Curambourg - B.P. 210

45403 FLEURY-LES-AUBRAIS CEDEX

# **BULLETIN TECHNIQUE Nº 375**

**30 DECEMBRE 1981** 

## PUCERONS ET JAUNISSE NANISANTE

/ CEREALES /

Une régression des populations de pucerons a encore été constatée ces derniers jours dans les cultures d'orges d'hiver.

#### CHARANCON DU BOURGEON TERMINAL

/ COLZA /

Dans les zones traditionnellement infestées de Champagne Berrichonne (notamment dans la région de Bourges), de récents comptages ont montré le début de la migration des larves vers le bourgeon terminal mais les éclosions se poursuivent.

Dans ces situations il est conseillé de réaliser des sondages dans chaque culture et d'intervenir si la migration est amorcée. Il est possible d'utiliser un oléoparathion à raison de 360 grammes de matière active par hectare.

### GROSSE ALTISE

Des larves de grosses altises sont actuellement observées dans les cultures. Elles sont encore jeunes et les niveaux d'infestation sont en général relativement faibles (infestation inférieure à une larve en moyenne par plante).

Cependant, le niveau d'infestation étant très variable d'une parcelle à une autre, il convient de réaliser des sondages dans chaque culture sur une cinquantaine de plantes afin de s'assurer que le seuil d'intervention de deux plantes sur trois hébergeant au-moins une larve n'est pas atteint.

Si un traitement s'avère nécessaire, il convient de préférer un insecticide à base de parathion éthyl à raison de 300 g de matière active par hectare ou de paration méthyl à raison de 350 g de parathion par hectare. L'emploi d'un oléoparathion à la dose de 350 grammes de parathion par hectare est conseillé sur un feuillage mouillé lorsque l'on craint un lessivage important.

# REABONNEMENT AUX AVERTISSEMENTS AGRICOLES

Les abonnements aux Bulletins Techniques de la Station d'Avertissements Agricoles CENTRE souscrits en 1981 se terminent avec ce dernier Bulletin.

Il est donc nécessaire de renouveler tout abonnement dans les meilleurs délais en précisant l'édition choisie.

Les modalités de réabonnement ont été indiquées dans le Bulletin Technique du 17 Novembre dernier.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie Chef de la Circonscription Phytosanitaire CENTRE

A. SIMONIN

Imprimerie de la Station "Centre". Le Directeur -Gérant: J. THIAULT

P549